


香港郊野常見蝴蝶




蝴蝶

蝴蝶在分類學上屬鱗翅目的一員，顧名思義，蝴蝶色彩斑駁的翅膀是由無數的鱗片組成。不同的身體形態及行為模式能夠讓我們辨認不同蝴蝶的種類。

鳳蝶科 Papilionidae

大部分體型碩大，前翅多為黑色，物種辨認主要依靠後翅的色彩斑紋。飛行能力強，不時滑翔，訪花時亦會一直拍動翅膀



蝴蝶


弄蝶科 Hesperidae

多為小型蝴蝶，翅膀顏色多為褐色，前翅形狀呈直角三角形

部分弄蝶休息時會將後翅平開，呈「戰機」形狀

腌翅弄蝶 (25-35 mm)

Forest Hopper
Astictopterus jama



弄蝶觸角呈鉤狀或錘狀

弄蝶科 Hesperidae

沾邊裙弄蝶 (35-40 mm)

Water Snow Flat
Tagiades litigiosus




灰蝶科 Lycaenidae

小型蝴蝶，翅底多為灰色，而翅面則常有金屬藍或紫色

彩灰蝶 (30 mm)

Purple Sapphire
Heliophorus epicles


部分灰蝶有模仿頭部的翅尾



灰蝶科 Lycaenidae

鈕灰蝶 (30 mm)

Common Hedge Blue
Acytolepis puspa



灰白色翅底上的黑色斑紋為物種辨認特徵

蛱蝶科 Riodinidae

小型蝴蝶，休息時翅常呈半展開狀




波蛱蝶 (35-40 mm)

Punchinello
Zemeros flegyas




蛱蝶科 Nymphalidae

為中型至大型蝴蝶，當中涵蓋多個亞科，身體形態、翅膀顏色及斑紋複雜多變



蛱蝶休息時常
平展翅膀

中環蛱蝶 (50-60 mm)
Common Sailer
Neptis hylas




蛱蝶科 Nymphalidae

網絲蛱蝶 (45-55 mm)
Common Mapwing
Cyrestis thyodamas

蛱蝶科 Nymphalidae

白帶螯蛱蝶 (65-90 mm)
Tawny Rajah
Charaxes bernardus




部分蛱蝶偏愛吸食樹液、
腐果汁液、以及動物糞便

蛱蝶科—眼蝶亞科 Satyrinae

眼蝶翅膀有眼狀斑紋，但在旱季
個體上眼斑會較小或消失

小眉眼蝶 (40-50 mm)
Dark-brand Bush Brown
Mycalesis mineus




蛱蝶科—眼蝶亞科 Satyrinae

白帶黛眼蝶 (50-55 mm)
Banded Tree Brown
Lethe confusa

蛱蝶科—眼蝶亞科 Satyrinae

環蝶多出現於林底，翅膀
上有由圓點組成環狀紋



串珠環蝶 (60-70 mm)
Large Faun
Faunis eumeus



蝴蝶

蛱蝶科—斑蝶亞科 Danainae

斑蝶體內有毒素，飛行緩慢，據外觀常分為「烏鴉型」和「老虎型」

藍點紫斑蝶 (80-95 mm)
Blue-spotted Crow
Euploea midamus



烏鴉型斑蝶常具深褐色的翅膀，
日光照射下呈金屬紫藍色

蛱蝶科—斑蝶亞科 Danainae




虎斑蝶 (70-80 mm)
Common Tiger
Danaus genutia

老虎型斑蝶翅膀常具黑色
條形斑紋，顏色對比比較明顯

粉蝶科 Pieridae


多為中型蝴蝶，翅膀顏色
以白及黃色為主

寬邊黃粉蝶 (40-50 mm)
Common Grass Yellow
Eurema hecabe



粉蝶科 Pieridae

報喜斑粉蝶 (60-70 mm)
Red-base Jezebel
Delias pasithoe



部分粉蝶飛行較為緩慢，
常貼近草被及地面

粉蝶科 Pieridae

東方菜粉蝶 (50-60 mm)
Indian Cabbage White
Pieris canidia



粉蝶後翅翅緣多為圓形

